

Année universitaire 2021-2022

**TD  
OUTILS MATHÉMATIQUES ET  
LOGICIELS**

**SEMESTRE 2**

Auteur : Florent ARNAL

Adresse électronique : [florent.arnal@u-bordeaux.fr](mailto:florent.arnal@u-bordeaux.fr)

Site : <http://flarnal.e-monsite.com>

### Niveau de difficultés des exercices

Pour vous aider à vous positionner, les exercices sont repérés par des  $\star$  avec la signification suivante :

$\star$  : exercice facile (application directe du cours, exercice de révision, ...).

$\star\star$  : exercice de niveau intermédiaire mettant en jeu des compétences attendues.

$\star\star\star$  : exercice proposant un prolongement ou faisant intervenir des notions difficiles (compétences non exigibles).

## COMPLÉMENTS SUR LE PRODUIT SCALAIRE DANS LE PLAN

**Capacités attendues :**

- Calculer le produit scalaire de deux vecteurs en utilisant différentes formules.
- Déterminer un angle à partir du produit scalaire.
- Exprimer les coordonnées d'un vecteur dans une base.

**I Différentes formes du produit scalaire**

DÉFINITION 1 : Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs.  
Le produit scalaire de  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est défini par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

PROPRIÉTÉ 1 : Soient  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  des vecteurs et  $k$  un réel.

1. Le produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique (définie positive). Ainsi :
  - $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
  - $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$
  - $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
2.  $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$

PROPRIÉTÉ 2 : Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs.  
Le produit scalaire de  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est défini par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

Démonstration :

Application :

On rapporte le plan au repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

On note  $\vec{u}$  un vecteur quelconque. Déterminer les produits scalaires suivants :

$$\vec{u} \cdot \vec{u} =$$

$$(2\vec{u}) \cdot (3\vec{u}) =$$

$$\vec{i} \cdot \vec{j} =$$

$$\vec{i} \cdot \vec{i} =$$

- Expression analytique dans un repère orthonormé :

On rapporte le plan au repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . Considérons deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  de coordonnées respectives  $(x; y)$  et  $(x'; y')$ . Déterminons le produit scalaire de ces deux vecteurs.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} =$$


PROPRIÉTÉ 3 : Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs. On a

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$$

- Expression à l'aide des projections :

On considère quatre points du plan  $A, B, C$  et  $D$ .

On note  $C'$  et  $D'$  les projetés orthogonaux respectifs de  $C$  et  $D$  sur la droite  $(AB)$ .



PROPRIÉTÉ 4 : On considère quatre points du plan  $A, B, C$  et  $D$ .

On note  $C'$  et  $D'$  les projetés orthogonaux respectifs de  $C$  et  $D$  sur la droite  $(AB)$ . On a

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{C'D'}$$

## II Propriétés du produit scalaire

PROPRIÉTÉ 5 : Deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux si et seulement si  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ .

PROPRIÉTÉ 6 : Inégalités de Cauchy-Schwarz et triangulaire

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ .

- $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$
- $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$

## III Exercices


### Exercice 1 :

On considère les vecteurs  $\vec{u}(2; 1)$ ,  $\vec{v}(-2; 4)$ ,  $\vec{w}(1; 2)$  ainsi que le vecteur  $\vec{a}(3; 3)$

1. Représenter les vecteurs  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$ ,  $\vec{w}$  et  $\vec{a}$
2. (a) Déterminer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  ainsi que  $\vec{u} \cdot \vec{w}$ .  
 (b) Quelle est la norme de  $\frac{1}{4\sqrt{5}} (\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{w}$ ?  
 (c) Simplifier  $(\vec{w} \cdot \vec{v}) \vec{w}$ .  
 (d) Déterminer une mesure, en degrés, de l'angle orienté  $(\vec{u}; \vec{w})$ .
3. (a) Déterminer graphiquement des valeurs approchées des coordonnées  $(\alpha; \beta)$  de  $\vec{a}$  dans la base  $(\vec{u}; \vec{v})$ .  
 (b) Déterminer, par calcul, les valeurs de  $\alpha$  et  $\beta$ .
4. (a) Déterminer graphiquement des valeurs approchées des coordonnées  $(\alpha'; \beta')$  de  $\vec{a}$  dans la base  $(\vec{u}; \vec{w})$ .  
 (b) Déterminer, par calcul, les valeurs de  $\alpha'$  et  $\beta'$ .

### Exercice 2 :

On considère un triangle  $ABC$  rectangle en  $B$  tel que  $AB = 4$  et  $BC = 3$ .



1. Soit  $\vec{u}$  un vecteur colinéaire et de même sens que  $\overrightarrow{AB}$  et de norme 2.  
Calculer  $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AB}$  et  $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AC}$  (on pourra décomposer  $\overrightarrow{AC}$  en somme de deux vecteurs).
2. Soit un vecteur  $\vec{v}$ , de même norme que  $\vec{u}$ , tel que  $(\vec{u}, \vec{v}) = -30^\circ$ .  
Calculer  $\vec{v} \cdot \overrightarrow{AB}$  et  $\vec{v} \cdot \overrightarrow{AC}$



## TD 1 : APPLICATIONS DES NOMBRES COMPLEXES

**Capacités attendues :**

- Utiliser les formules d'addition et de duplication en trigonométrie.
- Transformer un signal du type  $a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t)$  sous la forme  $A \sin(\omega t + \varphi)$ .
- Linéariser  $\cos^n x$  et  $\sin^n x$  pour  $n = 2$  et  $n = 3$ .
- Factoriser un polynôme à coefficients réels.

## Trigonométrie

**Exercice 1 :** \*\*

Exprimer en fonction de  $\cos x$  et  $\sin x$  les expressions suivantes :

$$A = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right), B = 2 \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \text{ et } C = \cos(x + \pi).$$

**Exercice 2 :** \*\*

Exprimer en fonction de  $\cos(\omega x)$  et  $\sin(\omega x)$  les expressions suivantes :

$$A = \sqrt{3} \sin(\omega x) + \cos(\omega x) \text{ et } B = 2 \sin(\omega x) - 2 \cos(\omega x).$$

**Exercice 3 :** \*\*

Linéariser  $\cos^2 \theta$  ainsi que  $\sin^3 \theta$ .

**Exercice 4 :** \*\*\*

Montrer que, pour tous réels  $a$  et  $b$ , on a

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

## Factorisation de polynômes

**Exercice 5 :** \*\*

Soit  $P$  le polynôme défini par

$$P = X^3 - 6X^2 + 11X - 6$$

1. En procédant par identification, déterminer trois réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que

$$P = (X - 1)(aX^2 + bX + c)$$

2. À l'aide d'une division euclidienne, déterminer trois réels  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$  tels que

$$P = (X - 2)(\alpha X^2 + \beta X + \gamma)$$

3. Factoriser, en produit de polynômes irréductibles,  $P$ .

**Exercice 6 :** \*

Factoriser, dans  $\mathbb{C}[X]$ , les polynômes suivants :

$$P(X) = 2X^2 + 8X + 6 \quad ; \quad Q(X) = -X^2 + 4X - 4 \quad ; \quad R(X) = X^2 - 2X + 2$$

**Exercice 7 :** \*\*

Déterminer le polynôme  $P$  de degré 3, de coefficient dominant 2, admettant pour racines  $-1$  et  $2j$ .

**Exercice 8 : \*\***

On considère le polynôme

$$S(X) = X^3 - 3X^2 + 4X - 2$$

Après avoir déterminé une racine (évidente), factoriser, dans  $\mathbb{C}[X]$  et  $\mathbb{R}[X]$ , ce polynôme.

**Exercice 9 : \*\***

Factoriser, dans  $\mathbb{C}[X]$  et  $\mathbb{R}[X]$ , les polynômes suivants :

$$A(X) = 2X^3 - 16.$$

$$B(X) = X^4 - X.$$

$$C(X) = X^3 + X - 2.$$

**Exercice 10 : \*\***

Factoriser dans  $\mathbb{C}[X]$  puis dans  $\mathbb{R}[X]$  le polynôme

$$R(X) = X^4 - X^3 + X^2 - 11X + 10$$

**Exercice 11 : \*\*\***

Factoriser dans  $\mathbb{C}[X]$  puis dans  $\mathbb{R}[X]$  les polynômes suivants :

$$Q(X) = X^5 + X^4 - X^3 - X^2 + X + 1$$

$$R(X) = 2X^3 - X^2 - 2X + 6$$

*Indication pour la dernière factorisation : on pourra calculer  $Q(1+j)$ .*

**Exercice 12 : \*\*\***

Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation :  $X^4 - 2X^2 \cos \varphi + 1 = 0$  avec  $\varphi \in ]0; \pi]$ .



**TD 2 : DÉCOMPOSITION EN ELEMENTS SIMPLES**
**Capacités attendues :**

- Écrire la forme générale d'une décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle dans  $\mathbb{R}(X)$ .
- Calculer les coefficients d'éléments de première espèce du type  $\frac{a}{(X-\lambda)^n}$ .
- Calculer les coefficients d'éléments de seconde espèce du type  $\frac{aX+b}{X^2+\alpha X+\beta}$  avec  $\Delta < 0$ .

**Exercice 1 : \***

Dans cet exercice, aucun calcul de coefficient n'est à effectuer.

Écrire la forme générale de la décomposition en éléments simples sur  $\mathbb{R}$  des fractions rationnelles suivantes :

$$F(X) = \frac{2}{X^2+3X+2} \quad ; \quad G(X) = \frac{2}{X^3+3X^2} \quad ; \quad H(X) = \frac{2X^2+1}{X^2+X} \quad ; \quad K(X) = \frac{2}{X^3+2X^2+X}$$

**Exercice 2 : \*\***

Décomposer en éléments simples les fractions rationnelles suivantes dans  $\mathbb{R}(X)$  :

- $F(X) = \frac{2}{X^2+3X+2}$

- $G(X) = \frac{2}{X^3+3X^2}$

- $H(X) = \frac{2X^2+1}{X^2+X}$

**Exercice 3 : \*\***

Décomposer en éléments simples les fractions rationnelles suivantes dans  $\mathbb{R}(X)$  :

- $F_1(X) = \frac{3X^2-X+1}{X^3-2X^2+X}$

- $F_2(X) = \frac{4}{(X^2-1)^2}$

- $F_3(X) = \frac{X^3+2X-1}{X(X-1)}$

- $F_4(X) = \frac{X+2}{X^3-8}$

**Exercice 4 : \*\***

Décomposer en éléments simples les fractions rationnelles suivantes dans  $\mathbb{R}(X)$  :

- $F_5(X) = \frac{2}{X^2(X-2)}$

- $F_6(X) = \frac{1}{X(X^2+1)}$

- $F_7(X) = \frac{2X-1}{X^2-3X+2}$

- $F_8(X) = \frac{X^4}{X^2-X-6}$

**Exercice 5 : \*\*\***

Soit  $F = \frac{P}{Q}$  une fraction rationnelle irréductible et  $\alpha$  un pôle simple de  $F$ .

On peut donc écrire  $Q = (X - \alpha)\widehat{Q}$  avec  $\widehat{Q}(\alpha) \neq 0$  ce qui conduit à une décomposition en éléments simples de la forme :

$F = \frac{P}{(X - \alpha)\widehat{Q}} = G + \frac{\lambda}{X - \alpha}$  où  $G$  est une fraction rationnelle dont  $\alpha$  n'est pas un pôle.

1. Montrer que :  $\lambda = \frac{P(\alpha)}{Q'(\alpha)}$ .

2. En déduire la décomposition en éléments simples de  $F = \frac{3X - 4}{X^2 - 3X + 2}$ .

3. On pose  $\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$  avec  $k \in \{0, \dots, n-1\}$  et  $n \geq 2$ .

Réduire au même dénominateur  $F = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{X - \omega_k}$ .

## TD 3 : INTÉGRATION

**Capacités attendues :**

- Calculer une intégrale à l'aide d'une intégration par parties.
- Calculer une intégrale à l'aide d'un changement de variables.
- Calculer des valeurs moyennes et efficaces de signaux.
- Déterminer la nature d'une intégrale impropre. Effectuer un calcul en cas de convergence.

## Intégration par parties

**Exercice 1 : \*\***

Calculer les intégrales suivantes :

$$A = \int_0^1 x e^{3x} dx \quad ; \quad B = \int_1^t x \ln x dx \text{ où } t > 0 \quad ; \quad C = \int_0^{\frac{\pi}{3}} x \sin(3x) dx.$$

## Valeurs moyenne et efficace

**Exercice 2 : \*\***

Déterminer les valeurs moyennes et efficaces des signaux ci-dessous :

$$s(t) = 3 \sin(\omega t) \text{ et } f(t) = 3 \sin(\omega t) + 1$$

## Changements de variable

**Exercice 3 : \*\***

Calculer les intégrales suivantes :

$$A = \int_0^3 \frac{dx}{9+x^2} \text{ en posant } t = \frac{x}{3} \quad \text{et} \quad B = \int_1^2 (\ln x)^2 dx \text{ en posant } y = \ln x.$$

## Parité et intégration

**Exercice 4 : \*\*\***Soit  $f$  une fonction continue sur  $\mathbb{R}$  et  $\phi$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $\phi(x) = \int_{-x}^x f(t) dt$ .1. Justifier que  $\phi$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et déterminer  $\phi'(x)$  ainsi que  $\phi(0)$ .2. Montrer que si  $f$  est paire alors  $\int_{-x}^x f(t) dt = 2 \int_0^x f(t) dt$ .3. Montrer que si  $f$  est impaire alors  $\int_{-x}^x f(t) dt = 0$ .**Exercice 5 : \*\***On considère la fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 2-périodique, impaire et vérifiant

$$f(t) = \frac{1-t}{3} \text{ pour tout } t \in ]0, 1[.$$

1. Déterminer  $f(0)$ .
2. Représenter graphiquement cette fonction.
3. Déterminer la valeur moyenne de  $f$ .
4. Déterminer la moyenne quadratique de  $f$ .

## Intégrales généralisées

**Exercice 6 : \*\***

Étudier la nature des intégrales suivantes et donner sa valeur si elle converge.

$$I_1 = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt \quad ; \quad I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t} dt \quad ; \quad I_3 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt \quad ; \quad I_4 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \quad ; \quad I_5 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt$$

**Exercice 7 : \*\***

- Calculer

$$I = \int_2^{+\infty} \frac{1}{t^2 - 1} dt$$

- On considère l'intégrale

$$K = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+1)\sqrt{t}} dt$$

En posant  $x = \sqrt{t}$ , calculer cette intégrale.

## Pour aller plus loin

**Exercice 8 : \*\*\***

- Calculer l'intégrale  $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4 x dx$ .

- En déduire, à l'aide du changement de variable  $t = \arctan x$ , la valeur de l'intégrale

$$J = \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^3} dx.$$

**Exercice 9 : Suites et intégrales \*\*\***

On considère la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(t) = |\sin(t)|$ .

- Calculer  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f^2(t) dt$ .

- Calculer la valeur de  $I_n = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(t) \cos(2nt) dt$  pour tout entier  $n$  non nul.

**Exercice 10 : Intégrale de Wallis \*\*\***

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$ .

- Montrer que  $I_n > 0$  puis que  $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt$  (en posant  $x = \frac{\pi}{2} - t$ ).
- Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$ .
- Donner une expression de  $I_n$  à l'aide de factoriels en distinguant les cas  $n = 2p$  et  $n = 2p + 1$ .

**TD 4 : ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES**
**Capacités attendues :**

- Résoudre une équation différentielle du premier ordre à coefficients constants.
- Résoudre une équation différentielle du second ordre à coefficients constants.
- Rechercher une solution particulière de la même forme que le second membre.

**Exercice 1 : \*\***

Résoudre les équations différentielles du 1<sup>er</sup> ordre suivantes :

1.  $y' + 3y = 0$
2.  $y' = -y + 1$  et  $y(0) = 1$
3.  $y' + 2y = x + 5$
4.  $y' + 2y = 2e^x$ .

**Exercice 2 : \*\***

On considère l'équation différentielle ( $E$ ) :

$$y' + y = \cos t$$

1. Résoudre sur  $\mathbb{R}$  l'équation différentielle ( $E$ ).
2. Donner la solution générale de ( $E$ ) sous la forme  $t \mapsto Ce^{-t} + A \sin(\omega t + \varphi)$ .
3. Déterminer la ou les solutions de ( $E$ ) vérifiant  $y(0) = 0$ .

**Exercice 3 : \*\***

Résoudre les équations différentielles du second ordre suivantes :

1.  $y'' + 4y' + 5y = 0$
2.  $y'' - 2y' - 3y = -3$
3.  $y'' - 2y' + y = 0$  avec  $y(0) = 2$ .

**Exercice 4 : \*\***

Résoudre les équations différentielles du second ordre suivantes :

1.  $y'' + 4y = 10$ , sachant que  $y(0) = 0$  et  $y'(0) = 0$ .
2.  $y'' - 4y' + 5y = 0$ .
3.  $y'' - 4y' + 5y = x$ .

**Exercice 5 : \*\***

1. Résoudre l'équation différentielle  $L \frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q = 0$  où  $R$  et  $C$  sont des constantes non nulles.

2. Résoudre les équations différentielles suivantes :

(a)  $\frac{dv}{dt} + \frac{gE}{m} = 0$ .

(b)  $m \frac{dv}{dt} + \rho v = mg$ .

3. Intensité dans un circuit électrique

(a) Résoudre l'équation différentielle  $L \frac{di}{dt} + Ri = E$  sachant que  $i(0) = 0$  ( $R, L$  et  $E$  sont des constantes non nulles).

(b) En déduire la durée  $t_0$  au terme de laquelle  $i(t_0) = \frac{1}{2} \lim_{\infty} i$ .

**Exercice 6 : \*\*\***

Résoudre l'équation différentielle suivante :

$$y'' + 4y' + 8y = \sin x$$

**Exercice 7 : \*\*\***

Déterminer les fonctions  $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$  dérivables telles que :

$$\forall x \in [0; 1], f'(x) + f(x) = f(0) + f(1)$$

Indication : L'équation différentielle associée est du type  $y' + y = D \dots$

**Exercice 8 : \*\*\***

Déterminer les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continues telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \int_0^x t f(t) dt + 1$$

Indication : On peut montrer que  $f$  est dérivable et déterminer une équation différentielle du premier ordre vérifiée par  $f \dots$

**TD 5 : TRANSFORMATION DE LAPLACE**
**Capacités attendues :**

- Déterminer, notamment par calcul, la transformée de Laplace d'une fonction.
- Déterminer la transformée de Laplace inverse d'une fonction.
- Résoudre une équation différentielle en utilisant la transformée de Laplace.

**Exercice 1 : \*\***

Représenter les signaux suivants ci-dessous et déterminer, par calcul, la transformée de Laplace associée.

$$f(t) = e^{-t}u(t) \quad \text{et} \quad g(t) = u(t) - u(t-2)$$

**Exercice 2 : \*\*\***

Déterminer, par calcul, la transformée de Laplace de la fonction  $f$  définie par

$$f(t) = tu(t)$$

**Exercice 3 : \*\*\***

Déterminer le domaine de définition de la fonction  $F$  (d'une variable réelle) définie par

$$F(x) = \int_0^{+\infty} t^2 e^{-xt} dt$$

**Exercice 4 : \***

Représenter les courbes représentatives des fonctions suivantes :

$$\begin{aligned} f &: t \mapsto \sin(t)u(t) & f_1 &: t \mapsto \sin(t)u\left(t - \frac{\pi}{4}\right) \\ f_2 &: t \mapsto u(t)\sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right) & f_3 &: t \mapsto \sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right)u\left(t - \frac{\pi}{4}\right) \\ h &: t \mapsto 2t[u(t) - u(t-1)] & h_1 &: t \mapsto \sum_{k=0}^3 h(t-k) \end{aligned}$$

**Exercice 5 : \*\***

Déterminer les transformées de Laplace des fonctions définies par :

$$\begin{aligned} f(t) &= [4 + 2 \cos(3t)]u(t) & g(t) &= [5 + 3 \sin(3t)]u(t) \\ h(t) &= (2t^3 - 1)u(t) & i(t) &= (1 - e^{-2t})\sin(3t)u(t) \\ j(t) &= [2 \cos(\omega t - \frac{\pi}{3})]u(t) & k(t) &= u(t) - u(t-2) \\ l(t) &= t[u(t) - u(t-2)] \end{aligned}$$

**Exercice 6 : \*\***

Déterminer, en utilisant deux méthodes (formules), la transformée de Laplace de la fonction définie par :

$$f(t) = [te^{-3t}]u(t)$$

**Exercice 7 : \*\***

Déterminer la transformée de Laplace de la fonction  $f$  définie par :

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < \frac{\pi}{3} \\ 2 \cos\left(t - \frac{\pi}{3}\right) & \text{si } t \geq \frac{\pi}{3} \end{cases} .$$

**Exercice 8 : \*\***

Déterminer la transformée de Laplace inverse de la fraction rationnelle  $F$  définie par

$$F(p) = \frac{2}{p^2 - 1}$$

**Exercice 9 : \*\***

Déterminer la transformée de Laplace inverse des fractions rationnelles suivantes :

$$F_1(p) = \frac{2p+1}{p^2-4p-5} \quad F_2(p) = \frac{p^2+1}{p^2-p}$$

$$F_3(p) = \frac{p+1}{(p+3)^2} \quad F_4(p) = \frac{3}{(p^2+2p+3)(p-1)}$$

**Exercice 10 : \*\***

En utilisant la transformation de Laplace, résoudre les équations différentielles suivantes :

1.  $y' + 2y = u(t)$  avec  $y(0) = 0$ .
2.  $y'' + 4y = -6$  avec  $y(0) = -1$  et  $y'(0) = 0$ .
3.  $y' + y = \cos(t)u(t)$

**Exercice 11 : \*\***

Résoudre, à l'aide de la transformée de Laplace, l'équation différentielle  $(E)$  définie sur  $[0; +\infty[$  ( $\tau$ ,  $E_1$  et  $E_2$  étant des constantes)

$$(E) \quad \begin{cases} \tau \frac{dv}{dt} + v = E_2 \\ v(0) = E_1 \end{cases}$$

**Exercice 12 : \*\*\***

Soit  $F(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$  avec  $N$  et  $D$  deux polynômes de  $\mathbb{R}[X]$  tels que  $\deg(N) < \deg(D)$ .

On suppose, en outre, que  $F$  possède uniquement deux pôles complexes conjugués simples de la forme  $\alpha = a \pm jb$ .

1. Démontrer que son original est de la forme  $f : t \mapsto K e^{at} \sin(bt + \varphi)$ .
2. En déduire une condition nécessaire et suffisante sur les pôles complexes pour que  $\lim_{+\infty} f = 0$ .



## TD 6 : SUITES ET SERIES

**Capacités attendues :**

- Déterminer la nature d'une suite et sa limite éventuelle.
- Exprimer le terme général d'une suite arithmétique, géométrique.
- Connaître les méthodes de calculs des séries géométriques et télescopiques.
- Déterminer la nature d'une série et sa somme éventuelle.

## Calculs de limites - Études de convergence

**Exercice 1 :** \*

Étudier la convergence des suites suivantes définies par la donnée de leur terme général :

$$u_n = \frac{3n-2}{9n^2+2} \quad ; \quad v_n = \frac{2}{4^{n+1}} \quad ; \quad w_n = n \sin\left(\frac{1}{n}\right) \quad ; \quad x_n = n^{\frac{1}{n}} \quad ; \quad y_n = n\left(1 - e^{\frac{1}{3n}}\right)$$

## Suites géométriques et arithmétiques

**Exercice 2 :** \*\*

On note  $(u_n)$  la suite définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = \frac{e^n}{3^{n+2}}$ .

1. Vérifier que la suite  $(u_n)$  est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
2. Quelle est la limite de  $(S_n)$  définie par  $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$  ?

**Exercice 3 :** \*\*

On note  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 = e^3$  et, pour tout entier naturel  $n$ , par  $u_{n+1} = e\sqrt{u_n}$ .  
On note  $(v_n)$  la suite définie pour tout entier naturel  $n$  par  $v_n = \ln(u_n) - 2$ .

1. Vérifier que la suite  $(v_n)$  est une suite géométrique.
2. En déduire l'expression de  $u_n$  en fonction de  $n$  et la limite de la suite  $(u_n)$ .

## Séries : Nature et somme

**Exercice 4 :** \*\*

1. Montrer que la série  $\sum \frac{2}{(n-1)n}$  est convergente puis calculer sa somme.
2. Calculer  $\sum_{k \geq 0} \left(\frac{1}{2}\right)^k$ ,  $\sum_{n \geq 0} \frac{e^n}{3^{n+1}}$  et  $\sum_{k \geq 1} \left(\frac{1}{3}\right)^k$ .

## Règles de d'Alembert et Cauchy

**Exercice 5 :** \*\*

Dans cet exercice, on va utiliser la notion de factorielle d'un entier définie ci-dessous.

Soit  $n$  un entier naturel. Sa factorielle, notée  $n!$ , est formellement définie par :

$$n! = \prod_{1 \leq i \leq n} i = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-1) \times n$$

Par convention, on pose  $0! = 1$ .

1. (a) Soit  $n$  un entier non nul. Montrer que

$$(n+1)! = n! \times (n+1)$$

(b) Montrer que la série  $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}$  est convergente.

(c) En utilisant que  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e$ , calculer

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n!} \text{ et } \sum_{n \geq 0} \frac{n+1}{n!}$$

2. Étudier la nature des séries suivantes :

$$\sum \frac{x^n}{n!} \quad (x > 0) \quad ; \quad \sum \frac{n!}{n^n} \quad ; \quad \sum \frac{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times 2n}{n^n} \quad ; \quad \sum \left( \frac{n+1}{n} \right)^{-n^2}$$

Pour aller plus loin

**Exercice 6 :** \*\*\*

Soient  $(x_n)$  et  $(y_n)$  deux suites réelles telles que, pour tout entier naturel  $n$ ,

$$x_{n+1} = \frac{x_n - y_n}{2} \quad \text{et} \quad y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}$$

En introduisant la suite complexe de terme général  $z_n = x_n + jy_n$ , montrer que les suites  $(x_n)$  et  $(y_n)$  convergent et déterminer leurs limites.

**Exercice 7 :** \*\*\*

Considérons la suite de terme général  $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ .

1. Démontrer que, pour tout entier non nul  $n$ ,  $S_{2n} \geq \frac{1}{2} + S_n$ .
2. Démontrer, à l'aide d'un raisonnement par l'absurde, que la suite  $(S_n)$  est divergente.

**Exercice 8 :** \*\*\* [Intégrales de Wallis]

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt$ .

1. Montrer que  $I_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t \, dt$  et  $I_n > 0$ .
2. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$ .
3. Donner une expression de  $I_n$  à l'aide de factoriels en distinguant les cas  $n = 2p$  et  $n = 2p + 1$ .
4. Établir que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $(n+1)I_{n+1}I_n = \frac{\pi}{2}$  et  $I_{n+2} \leq I_{n+1} \leq I_n$ .
5. Déterminer un équivalent de  $I_n$ .

**Exercice 9 :** \*\*\*

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose

$$I_n = \int_0^1 \frac{(1-x)^n}{n!} e^x \, dx$$

1. Déterminer la limite de la suite  $(I_n)$ .
2. Montrer que  $I_n = I_{n+1} + \frac{1}{(n+1)!}$ .
3. En déduire que  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e$ .

**Exercice 10 :** \*\*\*

Après en avoir justifié l'existence, calculer  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$  en utilisant que  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

